


Gastroskopi

Kikkertundersøgelse af mavesækken

Gastroskopi er en undersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Undersøgelsen udføres via munden med en lang bøjelig kikkert, hvor igennem der også kan tages vævsprøver. For at folde mavesækken ud, blæses der luft i mavesækken. Undersøgelsen foretages for at afsløre, om der er forandringer i spiserøret, mavesækken eller tolvfingertarmen (sår, betændelse, spiserørsbrok eller kræft).



Før undersøgelsen skal du møde fastende.

Det betyder at du senest må spise noget 6 timer før undersøgelsen.

Du må gerne **indtil 2 timer** før undersøgelsen, drikke i alt et glas (maks. 2 dl) vand, saft, te eller kaffe **uden mælkeprodukter**.

Eventuel nødvendig medicin kan indtages med en mundfuld vand.

HVIS du får mavesårsmedicin eller syredæmpende medicin – bedes du undlade at tage medicinen 1 uge før undersøgelsen - da det ellers kan være vanskeligt at påvise eventuelle slimhindeforandringer/mavesårsbakterier.

Du kan i stedet indtil 1 døgn før undersøgelsen tage håndkøbsmedicin mod syre (syreneutraliserende flydende medicin, tyggetabletter eller lignende).

Medicin

Får du hjerte-, lunge-, epilepsi- eller blodtryksmedicin, skal du tage dine tabletter som sædvanlig. Får du tabletter for sukkersyge, skal du dog først tage tabletterne efter undersøgelsen. Hvis du får Insulin er det som regel en god ide at tage halvdelen af den vanlige morgendosis, men ved tvivl kontakt da din egen læge.

Der gives normalt ikke beroligende medicin til undersøgelsen!

Blodfortyndende medicin

Hvis du er i behandling med Pradaxa, Xarelto, Eliquis eller Lixiana, skal du **ikke** tage det på selve undersøgelsesdagen.

Hvis du er i behandling med Clopidogrel, Efient eller Brilique, skal du **ikke** holde pause med medicinen.

Hvis du er i behandling med Marevan eller Marcoumar, skal du, via egen læge, have kontrolleret, at INR er i niveau.

Undersøgelsen

Vi tilbyder at lokalbedøve svælget med lokalbedøvende spray før undersøgelsen. Undersøgelsen foregår i venstre sideleje. Det gør ikke ondt at blive undersøgt. Kikkerten føres ind i munden og glider ned i spiserøret. Der er masser af plads til at trække vejret gennem næse eller mund. Undersøgelsen varer 5-10 minutter. Skal der tages vævsprøver dog 10-15 minutter.

De fleste finder undersøgelsen let til moderat ubehagelig på grund af opkastningsreflekser, som dog oftest kun er et problem de første 2-4 minutter af undersøgelsen.

Efter undersøgelsen

Hvis der er givet lokalbedøvelse med spray, må du først spise og drikke efter 1 time på grund af risiko for at få maden i luftrøret.

Kontakt i tilfælde af spørgsmål/komplikationer

Du kan kontakte os mandag til torsdag i vores telefontid.

Udenfor dette tidsrum, skal du ved mistanke om problemer (f.eks. pludselig opstået smerter, feber, blødning eller generel utilpashed) kontakte egen læge/lægevagten.

Svar på vævsprøver

Hvis der tages vævsprøver, foreligger der typisk svar efter 4-5 uger, og du vil modtage besked i din e-boks.

Såfremt der allerede ved undersøgelsen er mistanke om noget ondartet, vil der ofte være svar indenfor 1 uge.

Afbud

Ved afbud senere end en hverdag før eller udeblivelse, opkræves der, efter aftale med Danske Regioner, gebyr på kr. 500 og kr. 250 ved kontrol.

Erik Ditlev Hansen
speciallæge i kirurgi